

**Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Combudoron® Gel jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Bei offenen Brandwunden (Verbrennungen 3. Grades) oder falls Komplikationen bei der Wundheilung auftreten, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

**Die Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Combudoron® Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Combudoron® Gel beachten?
3. Wie ist Combudoron® Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Combudoron® Gel aufzubewahren?
6. Weitere Angaben



# Combudoron® Gel

**Zusammensetzung:**

10 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ethanol. Auszug aus Arnica montana, Planta tota rec. (1:1,1) 0,05 g / Urtica urens, Herba rec. Ø (HAB, V. 2b) 0,95 g.  
Gelgrundlage: Glycerol 85%, Ethanol 96%, Natriumalginat, Gereinigtes Wasser.

Combudoron® ist in Tuben zu 25 g und 70 g Gel erhältlich.



**1. Was ist Combudoron® Gel und wofür wird es angewendet?**

Combudoron® Gel ist ein anthroposophisches Arzneimittel zur äußerlichen Behandlung bei Verbrennungen

von:  
Weleda AG  
Postfach 1309 / 1320  
D-73503 Schwäbisch Gmünd  
Tel.: 07171 / 919-414  
Fax: 07171 / 919-424  
E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Anwendungsgebiete**

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten Verbrennungen 1. und 2. Grades (Rötung, Schwellungen, Brandblasen), Sonnenbrand, akute Strahlenschäden der Haut; Insektenstiche.

Zur **Erstversorgung** bei Verbrennungen oder Verbrühungen die entsprechenden Hautpartien **sofort unter kaltem Wasser kühlen**, bis der Schmerz abklingt. Anschließend wird Combudoron® Gel aufgetragen. Offene Brandwunden (Verbrennungen 3. Grades) und großflächige Verbrennungen bedürfen grundsätzlich der ärztlichen Behandlung.





## 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Combudoron® Gel beachten?

Combudoron® Gel darf nicht angewendet werden auf offenen Wunden und wenn Sie überempfindlich gegen Arnika und andere Gerblütler oder gegen Bestandteile der Gelgrundlage sind.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Combudoron® Gel**

Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen und Hauttrockenheit verursachen.

### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

## 3. Wie ist Combudoron® Gel anzuwenden?

Wenden Sie Combudoron® Gel immer genau

nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Combudoron® Gel wird auf die Haut aufgetragen. Wichtig ist die sofortige und anhaltende Behandlung der Wundstellen.

### *Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

Combudoron® Gel auf die betroffenen Hautpartien dünn auftragen und antrocknen lassen. Die Anwendung von Combudoron® Gel soll bis zum Abklingen der Schmerzen wiederholt werden. Wenn das Anlegen eines Verbandes notwendig ist, diesen nur auf das bereits angetrocknete Gel bringen.

### *Hinweis:*

Der Kontakt der Gels mit Augen und Schleimhäuten sollte vermieden werden.

Der Gelfilm lässt sich mit lauwarmem Wasser leicht abspülen.

### *Wie lange soll Combudoron® Gel angewendet werden?*

Combudoron® Gel wird angewendet solange die akuten Beschwerden anhalten. Danach kann die Behandlung mit Combudoron® Salbe fortgesetzt werden. Sollten Komplikationen bei der Wundheilung auftreten, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

### *Wenn Sie die Anwendung von Combudoron® Gel vergessen haben:*

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an,

wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Combudoron® Gel Nebenwirkungen haben.

Sehr selten können allergische Hautreaktionen auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

## 5. Wie ist Combudoron® Gel aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

### *Aufbewahrungsbedingungen:*

Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Aufbewahrung.

**Stand der Information:** Februar 2005

## 6. Weitere Angaben

**Von Combudoron® sind weitere Darreichungsformen und Packungsgrößen erhältlich:**

Combudoron® Flüssigkeit 50 ml und 100 ml  
Combudoron® Salbe 25 g und 70 g

